



# wzmocnienie odporności rodzin pszczelich



## Apistym

Produkt wzmacniający odporność pszczół  
(wyciąg z żeńszenia, kwas mlekowy, sacharoza)



- zwiększa odporność rodzin pszczelich, w szczególności na nosemozę
- przyspiesza rozwój pszczół
- preparat oparty na naturalnych składnikach, bez karencji na miód

**Skład w 1000 ml:** sacharoza 500 g

**Dodatki w 1000 ml:**

2b Wyciąg z żeńszienia 50 g; 2b08004 Kwas mlekowy 8,3 ml

Wilgotność: 45 %

**Skład analityczny/kg:** białko ogólne 226 g; włókno surowe 4,12 g; popiół surowy 516 g; fosfor 86,6 g.

### Wskazania

Apistym służy do poprawy kondycji rodzin pszczelich. Stosowanie preparatu zwiększa odporność rodzin pszczelich na choroby, w szczególności na nosemozę, wywołaną przez *Nosema apis* i *Nosema ceranae*.

### Właściwości

Zawarty w Apistymie ekstrakt żeńszienia wpływa na wzrost poziomu oksydazy fenolowej (enzymu biorącego udział w odpowiedzi immunologicznej), podnosząc odporność rodziny i zwiększając jej vitalność. Dzięki temu pszczoły łatwiej zwalczają zakażenia patogenami. Apistym podawany przy dokarmianiu jesiennym zwiększa przeżywalność rodzin pszczelich w zimie, a stosowany wiosną przyspiesza ich rozwój.

### Dawkowanie i sposób stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć!

Przygotowanie Apistymu z roztworem syropu cukrowego.

**Dokarmianie jesienne** – 4 ml Apistymu na 1 liter syropu cukrowego. Polewanie uliczek międzyramkowych, podkarmianie pobudzające – 20 ml Apistymu na 1 liter syropu cukrowego. Temperatura syropu nie powinna przekraczać 50°C.

### Stosowanie jesienią

Apistym należy stosować w roztworze syropu cukrowego lub w gotowych pokarmach dla pszczół w koncentracji 4 ml preparatu na 1 liter syropu. Przygotowany syrop cukrowy lub gotowy pokarm z Apistymem należy podawać rodzinom

pszczelim podczas dokarmiania jesiennego. Ilość podawanego pokarmu dostosować do siły rodziny. Zalecana dawka Apistymu na jedną rodzinę to 40 ml (10 litrów syropu). W przypadku podania mniejszej ilości syropu zaleca się dodatkowe, dwukrotne (w odstępie 7 – 10 dni) polewanie uliczek międzyramkowych roztworem Apistymu w syropie cukrowym o koncentracji 20 ml Apistymu na 1 liter w ilości 5 – 10 ml na uliczkę.

### Stosowanie wiosną i latem

Polewać uliczki pszczoły roztworem Apistymu w syropie cukrowym (20 ml na 1 liter) w ilości 5 – 10 ml na uliczkę, dwukrotnie (w odstępie 7 – 10 dni). Przygotowany do polewania uliczek roztwór Apistymu można także podać jako podkarmianie pobudzające w ilości 0,5 – 1 l na rodzinę. Powyższe dawkowanie zastosować przy każdym podkarmianiu pobudzającym. Apistym można podawać także z ciastem w ilości 4 ml preparatu na 1 kg ciasta na rodzinę pszczelą. Po otwarciu zużyć niezwłocznie. W przypadku niewykorzystania całej butelki preparat można przechować w lodówce maksymalnie 14 dni.

### Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Wielkość opakowania:** 200 ml

**Termin ważności:** 18 miesięcy

Apistym został opracowany przy udziale jednostek naukowo-badawczych UMCS z Lublina, UP Lublin i UJ z Krakowa. Skład jest chroniony zgłoszeniem patentowym, a jego właściwości potwierdziły badania laboratoryjne oraz zastosowanie w pasiekach.

Mieszaneczka paszowa uzupełniająca dla pszczół

Weterynaryjny numer identyfikacyjny: α P10614003p

2024-10-24 Data opracowania ulotki