



Biowet
PUŁAWY

PEŁNA OCHRONA RODZINY PSZCZELEJ

WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI
Apiflora
Apistym

ZWALCZANIE WARROZY - ECO
Api-Bioxal
ApiLifeVar

ZWALCZANIE WARROZY
Apistrip
Apiwarol®
Biowar®



www.biowet.pl

WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI

Apiflora

preparat probiotyczny
zawierający *Lactobacillus*

Liofilizat probiotycznych bakterii dla pszczół

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla pszczół



Suplementacja probiotykiem Apiflora jest szczególnie istotna w okresie, gdy pszczoły ograniczają kontakt ze środowiskiem zewnętrznym i występującymi naturalnie bakteriami probiotycznymi.

Preparat zawiera:

- * Bakterie fermentacji mlekowej
– *Lactobacillus* $\geq 1 \times 10^8$ CFU/fiolkę

JAK STOSOWAĆ?



Zerwać środkową część kapsła.



Za pomocą jednorazowej strzykawki fiolkę wypełnić w $\frac{3}{4}$ wodą o temp. pokojowej. Dokładnie wymieszać, aż do rozpuszczenia liofilizatu.



Pobrać strzykawką rozpuszczoną zawartość fiolki. Można podawać bezpośrednio na ramki.



* Drobnoustroje zawarte w produkcie zostały wyizolowane od zdrowych owadów pochodzących z rodzin o bardzo dobrej kondycji i wyselekcjonowane ze względu na wyróżniające się właściwości probiotyczne oraz bezpieczeństwo stosowania.

* Posiadają zdolność zasiedlania jelita pszczelego, wspomagając procesy trawienne, a poprzez zakwaszenie środowiska bytowania pomagają chronić przed zakażeniem i rozwojem mikroorganizmów patogennych takich jak *Paenibacillus larvae* czy *Nosema ceranae*.

* Bakterie z rodzaju *Lactobacillus* stanowią główną część naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego pszczół w okresie letnim.



Biowet
PUŁAWY




DAWKOWANIE PROBIOTYKU Apiflora

Jako dodatek do syropu cukrowego

w okresie podkarmiania wiosennego i letniego oraz jesiennego

Zawartość jednej fiołki produktu wymieszać z ostudzonym do temperatury pokojowej syropem cukrowym uzyskanym przez rozpuszczenie 2 kg cukru w 5 litrach wody.

- Nie należy używać gorącego syropu, ani syropu o wyższej koncentracji cukru, ze względu na negatywny wpływ na przeżywalność drobnoustrojów.
- Uzyskaną ilość syropu rozporcjować do podkarmiaczek dla 5 rodzin pszczoł.
- Tak przygotowany syrop można podać również w umiarkowanych ilościach bezpośrednio na ramki w ilości 5-10 ml.
- Powyższą procedurę powtórzyć jeszcze raz po tygodniu.



Rozpuszczona zawartość fiołki

Jako dodatek do wody pitnej dla pszczoł

zawartość jednej fiołki rozpuścić w 10 litrach wody pitnej dla pszczoł.

Podawanie Apiflory można powtarzać kilkakrotnie w ciągu roku. Apiflora zawiera drobnoustroje stanowiące naturalną florę bakteryjną pszczoł, może być więc stosowana niezależnie od innych produktów wspomagających zdrowie pszczoł.

Ilość: Kartonik zawiera 4 fiołki po 125 mg produktu.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2-8°C. W obowiązującym okresie ważności liofilizat może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15-25°C. Po rozpuszczeniu użyć natychmiast.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny α PL 0614003p.

Termin ważności: 18 miesięcy.

WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI

Apistym

wyciąg z żeńszenia, kwas mlekowy, sacharoza

zwiększa odporność rodzin pszczelich, w szczególności na nosemozę

przyspiesza rozwój pszczoł

oparty na naturalnych składnikach, bez karencji na miód



Wskazania

Apistym służy do poprawy kondycji rodzin pszczelich. Stosowanie preparatu zwiększa odporność rodzin pszczelich na choroby, w szczególności na nosemozę, wywołaną przez *Nosema apis* i *Nosema ceranae*.

Dawkowanie i sposób stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć!

Przygotowanie Apistymu z roztworem syropu cukrowego. Dokarmianie jesienne – 4 ml Apistymu na 1 litr syropu cukrowego. Polewanie uliczek międzyramkowych, podkarmianie pobudzające – 20 ml Apistymu na 1 litr syropu cukrowego. Temperatura syropu nie powinna przekraczać 50° C.

Stosowanie wiosną i latem

Polewać uliczki pszczele roztworem Apistymu w syropie cukrowym (20 ml na 1 litr) w ilości 5 – 10 ml na uliczkę, dwukrotnie (w odstępie 7 – 10 dni). Przygotowany do polewania uliczek roztwór Apistymu można także podać jako podkarmianie pobudzające w ilości 0,5 – 1 l na rodzinę. Powyższe dawkowanie zastosować przy każdym podkarmianiu pobudzającym.

Produkt wzmacniający odporność pszczoł
Mieszaneczka paszowa uzupełniająca dla pszczoł



Skład w 1000 ml:

- * wyciąg z żeńszenia 50 g
- * kwas mlekowy 8,3 ml
- * sacharoza 500 g

Dokarmianie wiosenne - przyspiesza rozwój pszczoł.

Dokarmianie jesienne - zwiększa przeżywalność rodzin pszczelich w zimie.

Zawarty w Apistymie ekstrakt żeńszenia wpływa na wzrost poziomu oksydazy fenolowej (enzymu biorącego udział w odpowiedzi immunologicznej), podnosząc odporność rodziny i zwiększając jej vitalność. Dzięki temu pszczoły łatwiej zwalczają zakażenia patogenami. Apistym podawany przy dokarmianiu jesiennym zwiększa przeżywalność rodzin pszczelich w zimie, a stosowany wiosną przyspiesza ich rozwój.

Stosowanie jesienią

Apistym należy stosować w roztworze syropu cukrowego lub w gotowych pokarmach dla pszczoł w koncentracji 4 ml preparatu na 1 litr syropu. Przygotowany syrop cukrowy lub gotowy pokarm z Apistymem należy podawać rodzinom pszczelim podczas dokarmiania jesiennego. Ilość podawanego pokarmu dostosować do siły rodziny. Zalecana dawka Apistymu na jedną rodzinę to 40 ml (10 litrów syropu). W przypadku podania mniejszej ilości syropu zaleca się dodatkowe, dwukrotne (w odstępie 7 – 10 dni) polewanie uliczek międzyramkowych roztworem Apistymu w syropie cukrowym o koncentracji 20 ml Apistymu na 1 litr w ilości 5 – 10 ml na uliczkę. Apistym można podawać także z ciastem w ilości 4 ml preparatu na 1 kg ciasta na rodzinę pszczelą.

Wielkość opakowania: 200 ml



Pełny opis produktu na opakowaniu oraz na www.biowet.pl

JAK STOSOWAĆ?

Apistym


Dawkowanie i sposób stosowania

Stosowanie jesienią

- **Podawanie z syropem:** 4 ml Apistymu na 1 litr syropu cukrowego

4 ml

1 litr




Zalecana dawka Apistymu na jedną rodzinę to: 40 ml (10 litrów syropu). Ilość podawanego pokarmu dostosować do rodziny pszczelej. Temperatura syropu nie powinna przekraczać 50°C.

- **Podawanie na ramki** - w przypadku podania mniejszej ilości syropu zaleca się polewanie w uliczki międzyramkowe ROZTWÓREM Apistymu w syropie cukrowym o koncentracji: 20 ml Apistymu na 1 litr syropu cukrowego.

20 ml

1 litr



5-10 ml ROZTWÓRU na jedną uliczkę dwukrotnie, w odstępie 7-10 dni.

Stosowanie wiosną i latem


20 ml

1 litr



ROZTWÓR do podawania wiosną i latem należy przygotować z 20 ml Apistymu na 1 litr syropu cukrowego.

- **Podawanie na ramki** - polewać w uliczki pszczele ROZTWÓREM



5-10 ml na jedną uliczkę ROZTWÓRU (20 ml Apistymu na 1 litr syropu cukrowego) dwukrotnie, w odstępie 7-10 dni.

- **Podawanie jako pokarm pobudzający:** przygotowany do polewania ROZTWÓR można także podać jako podkarmianie pobudzające w ilości 0,5 - 1 litra na rodzinę. Powyższe dawkowanie zastosować przy każdym podkarmianiu pobudzającym.

Podawanie z ciastem

4 ml

1 kg



Preparat Apistim można podawać z ciastem, w ilości 4 ml preparatu na 1 kg ciasta na rodzinę pszczelą.

Apistym przed użyciem należy wstrząsnąć. Po otwarciu zużyć niezwłocznie. W przypadku niewykorzystania całej butelki, preparat można przechowywać w lodówce maksymalnie 14 dni.

ZWALCZANIE WARROZY - ECO

Api-Bioxal

kwas szczawiowy dwuwodny 62 mg/ml

zawiera **kwas szczawiowy dwuwodny**

dawka 5 ml/1 uliczkę międzyramkową,
maksymalnie 50 ml/rodzinę

produkt gotowy do użycia, łatwe podanie

JAK STOSOWAĆ?

Dawkowanie i sposób podawania przez polewanie:

1. Leczenie polega na jednorazowym podaniu produktu.
2. Wymagana dawka to 5 ml na każdą uliczkę międzyramkową (odstęp pomiędzy górnymi listewkami ramek).
3. Produkt należy podawać za pomocą strzykawki wzdłuż każdej uliczki.
4. Maksymalna dawka wynosi 50 ml na rodzinę.
5. Stosować maksymalnie dwa razy w roku (w porze zimowej i/lub wiosenno-letniej).

Zalecenia dla prawidłowego stosowania:

- należy stosować jednocześnie we wszystkich rodzinach danej pasieki, aby zapobiec reinwazji
- w przypadku izolacji matek, produkt stosować po 25 dniach od izolacji, gdy w rodzinach nie ma już czerwiu

Produkt leczniczy weterynaryjny do zwalczania inwazji **Varroa destructor** u pszczoł miodnych.

1 ml zawiera:

Substancja czynna:

- * **kwas szczawiowy dwuwodny**
62,0 mg (co odpowiada 44,2 mg kwasu szczawiowego).



Dosa-Laif

Wygodny dozownik wielokrotnego użytku o pojemności 600 ml do odmierzania i stosowania produktu **Api-Bioxal**

- większy niż typowa strzykawka
 - łatwy pomiar objętości roztworu
- Dostępny w sprzedaży.



- stosować bez nadstawek na miód
- podczas pracy z roztworem należy nosić rękawice odporne na działanie kwasów i okulary ochronne, oraz jednorazową półmaskę (typ FFP2)

Roztwór do stosowania w ulu

Zawartość substancji czynnej i innych substancji

1 ml zawiera:

Substancja czynna: kwas szczawiowy dwuwodny 62,0 mg

(co odpowiada 44,2 mg kwasu szczawiowego).

Substancje pomocnicze: glicerol, woda oczyszczona.

Postać farmaceutyczna

Roztwór do stosowania w ulu. Klarowny, bezbarwny do jasnożółtego roztwór.

Wskazania lecznicze

Leczenie warrozy wywołanej przez *Varroa destructor* u pszczoł miodnych (Apis mellifera).

Przeciwwskazania Brak.

Działania niepożądane

Leczenie może nieznacznie zakłócić spokój rodziny pszczoł; pszczoły mogą być pobudzone. Po zastosowaniu produktu może wystąpić zwiększona śmiertelność dorosłych pszczoł. W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii. Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania (www.urpl.gov.pl).

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania

W ulu. Produkt należy stosować w następujący sposób: **Dawkowanie i sposób podawania przez polewanie:** Przed otwarciem opakowania bezpośredniego należy włożyć odpowiednią maskę ochronną, rękawice i okulary. Leczenie polega na jednorazowym podaniu produktu. Wymagana dawka to 5 ml na każdą uliczkę międzyramkową (odstęp pomiędzy górnymi listewkami ramek). Produkt należy podawać za pomocą strzykawki wzdłuż każdej uliczki. Maksymalna dawka wynosi 50 ml na ul. Stosować maksymalnie dwa razy w roku (w porze zimowej i/lub wiosenno-letniej).

Zalecenia dla prawidłowego podania Zintegrowany program walki z warrozą: Skuteczność w poszczególnych rodzinach pszczeli może być różna ze względu na warunki stosowania (obecność czerwii, temperatura, wrotna inwazja, itp.). Leczenie produktem powinno być stosowane jako jedna z metod zwalczania warrozy w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą, a osyp roztoczy powinien być regularnie monitorowany. Nie należy stosować równocześnie z innymi akarycydami.

Okres karencji Miód: Zero dni. Nie stosować w rodzinach z zapasami miodu, ani w czasie pożytku.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać oryginalne opakowanie szczelnie zamknięte w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać z dala od żywności. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie po upływie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt: Skuteczność produktu jest znacznie obniżona w obecności czerwii. Stosowanie produktu należy ograniczyć do rodzin bez czerwii lub z małą jego ilością. Z tego względu, leczenie najlepiej przeprowadzać zimą lub kiedy matki pszczoły są izolowane. W przypadku leczenia w lecie, w rodzinach z izolowanymi matkami, najwyższą skuteczność osiąga się, jeśli okres izolacji trwa co najmniej 25-dni, a w rodzinach nie ma już czerwii. Odpowiednią skuteczność można uzyskać w przypadku niewielkiej lub średniej inwazji *Varroa destructor*. Silnie porażone rodziny mogą ginąć z powodu inwazji roztoczy *Varroa destructor*, pomimo prawidłowego użycia produktu. Zaleca się stosowanie produktu w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą i regularne monitorowanie osypu roztoczy.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Powtarzanie leczenia może spowodować silne pobudzenie rodziny pszczoł. Wszystkie rodziny w tej samej pasiece należy leczyć równocześnie, aby nie dopuścić do ponownej inwazji. Nie należy zakłócać spokoju w ulach w ciągu kilku dni po leczeniu. W trakcie leczenia należy uważać, aby pozostałości produktu nie osiadły na ramkach, które nadal będą używane do produkcji miodu w danym sezonie. **Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:** Roztwór ma odczyn kwasny i może powodować poważne podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania produktu. Podczas pracy z roztworem (zarówno w fazie leczenia, jak i przed leczeniem) należy nosić jednorazową półmaskę oddechową zgodną z Normą Europejską EN149 (typ FFP2), rękawice odporne na działanie kwasów i okulary ochronne. Po podaniu produktu, należy umyć wodą z mydłem ręce oraz materiał, który miał kontakt z produktem. W przypadku kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W przypadku dostania się produktu do oczu, należy dokładnie przemyć oczy dużą ilością czystej, bieżącej wody oraz skontaktować się z lekarzem. Nie wdychać. W przypadku niezamierzonej inhalacji, umożliwić oddychanie świeżym powietrzem. W razie trudności z oddychaniem, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi etykietę produktu. W przypadku spożycia nie należy wywoływać wymiotów, lecz skontaktować się z lekarzem i okazać niniejsze ostrzeżenie. Podczas pracy z produktem nie należy jeść, pić ani palić. **Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:** Nie należy stosować równocześnie z innymi akarycydami. **Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):** W ulach, w których zastosowano potrójne dawki produktu (przez nakrapianie), zaobserwowano znacznie wyższą śmiertelność pszczoł. Ponadto przedawkowanie może powodować obniżenie zdolności rodziny pszczoł do zimowania, utratę matek pszczeli oraz może mieć wpływ na rozwój rodziny wiosną. **Główne niezdolności farmaceutyczne:** Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi. **Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nieużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów:** Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Api-Bioxal nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

Inne informacje: Butelka o pojemności 500 ml, pojemnik 51, pojemnik 51 bag-in-box. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy, Polska, tel.: +48 81 888 91 00

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Okres ważności: 3 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 3 miesiące.

Pozwolenie nr 3092/21

Podmiot odpowiedzialny:

CHEMICALS LAIF S.p.A.,

Viale dell'Artigianato 13, 35010 Vigonza (PD), Włochy

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

CHEMIFARMA S.p.A., Via Don Eugenio Servadei 16, 47100 Forlì (FC), Włochy



ZWALCZANIE WARROZY - ECO

ApiLifeVar

płytki zawierające olejki eteryczne

Produkt leczniczy weterynaryjny do zwalczania inwazji *Varroa destructor* u pszczoł miodnych. ApiLifeVar zawiera mieszanke olejków eterycznych, wśród których głównym komponentem jest tymol. Olejki eteryczne sublimują i parują wewnątrz leczonego ula pod wpływem temperatury.

oparty na naturalnych substancjach

do stosowania w pasiekach ekologicznych

1 płytka /rodzinę co 7 dni
całkowite leczenie - 4 płytki /rodzinę

łatwy i bezpieczny w użyciu

Bezpośrednie działanie Api Life Varu na roztocza *Varroa destructor*, odbywa się poprzez inhalację i kontakt.

**1 płytka zawiera połączenie
4 substancji czynnych:**

- * **Tymol** 8,00 g
- * **Olejek eukaliptusowy** 1,72 g
- * **Kamfora racemiczna** 0,39 g
- * **Lewomentol** 0,39 g

Kiedy stosować?

Koniec lata
po zbiorze miodu


Optymalna temperatura zewnętrzna
15–30°C (idealna 20–25°C)

Jak stosować?


1 płytka na rodzinę
co 7 dni

Raz w tygodniu przez 4 tygodnie

JAK STOSOWAĆ ApiLifeVar?



1. Otworzyć torebkę zawierającą dwie płytki.
2. Wyjąć jedną z dwóch płytek i podzielić płytkę na 2–4 części.
3. Otworzyć ul, odsłonić górne beleczki ramek gniazdowych. Umieścić pojedyncze części płytki w rogach ula, na górnych beleczkach ramek.



4. Zamknąć ul i pozostawić płytkę na 7 dni. Powtarzać zabieg przez kolejne trzy tygodnie.
Nie należy umieszczać produktu bezpośrednio nad środkiem gniazda oraz w sąsiedztwie czerwii.
Po zakończeniu leczenia kawałki płytek pozostałe w ulu powinny być usunięte.
Leczenie przeprowadzać raz w roku.



Biowet
PUŁAWY

Api Life Var

Płytki do umieszczania w ulu

Zawartość substancji czynnych i innych substancji

1 płytka zawiera:

Substancje czynne: tymol 8,00 g; olejek eukaliptusowy 1,72 g (1,8 Cineole > 1,2 g); kamfora racemiczna 0,39 g; lewomentol 0,39 g

Wskazania lecznicze

Zwalczanie inwazji *Varroa destructor* u pszczoł miodnych.

Dawkowanie, droga i sposób podania

1 płytka leku na rodzinę co 7 dni, całkowite leczenie – 4 płytki na każdy ul. Leczenie przeprowadzać raz w roku.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Sposób podania:

Odsłonić górne beleczki ramek gniazdowych przez uniesienie powalki nad miejscem podania produktu (w ulach bez powalki wyjąć beleczki powalkowe w miejscu podania).

Wyjąć jedną płytkę Api Life Var z torebki i umieścić ją na górnych beleczkach ramek, w jednym z rogów ula.

Nie umieszczać płytek w centralnej części ula oraz w sąsiedztwie czerwiu.

Można również podzielić płytkę na 3–4 części i ułożyć je na górnych beleczkach ramek.

Zamknąć ul i pozostawić płytkę na 7 dni.

Powtarzać zabieg przez kolejne trzy tygodnie.

Po zakończeniu leczenia kawałki płytek pozostałe w ulu powinny być usunięte.

Przeprowadzić leczenie po odebraniu miodu i po zdjęciu nadstawek.

Zaleca się kontrolę skuteczności w trakcie leczenia przez sprawdzanie liczby oсыpanych roztoczy na wkładkach dennicowych.

Optymalna temperatura zewnętrzna do skutecznego działania leku wynosi poniżej 30°C.

Średnia temperatura zewnętrzna poniżej 15°C obniża skuteczność produktu.

Okres karencji

Miód – zero dni. Ze względu na intensywny zapach produktu nie stosować go w okresie, kiedy w ulu znajduje się miód konsumpcyjny.

Przeciwwskazania

Nie stosować przy temperaturze w dzień powyżej 30°C, gdyż może to powodować zwiększenie stresu i śmiertelności zarówno dorosłych pszczoł, jak i czerwiu.

Działania niepożądane

Pszczoły mogą wynosić pokarm i czerw bezpośrednio spod płytki. Produkt może powodować zaniepokojenie pszczoł. Produkt może obniżyć spożycie pokarmu przez pszczoły, jeżeli dokarmianie przebiega jednocześnie z leczeniem. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <https://www.urpl.gov.pl> (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Chronić przed światłem. Przechowywać płytki w oryginalnym opakowaniu. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

W celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności produkt należy stosować pod koniec lata, po zbiorze miodu, gdy zmniejsza się ilość czerwiu.

Idealna temperatura zewnętrzna dla dobrej skuteczności produktu podczas leczenia wynosi 20–25°C. Należy oczekiwać niewystarczającej skuteczności, gdy średnia temperatura zewnętrzna wynosi poniżej 15°C.

Leczenie przeprowadzić po zdjęciu nadstawek.

Nie zaleca się stosowania produktu w ulach wielokorpusowych z uwagi na możliwe zmniejszenie skuteczności terapii.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

W celu ograniczenia ryzyka wtórnych zakażeń leczonych rodzin przez błądzące pszczoły z rodzin nieleczonych jak również uniknięcia rabunków, należy leczyć jednocześnie wszystkie rodziny w danej pasiece.

Unikać niepokojenia pszczoł.

Nie umieszczać płytek w centralnej części ula oraz w sąsiedztwie czerwiu.

Nigdy nie umieszczać płytek bezpośrednio przy podkarmiaczce, gdyż może to spowodować zmniejszenie pobierania pokarmu.

Unikać rabunków przez utrzymywanie w pasiece silnych i wyrównanych rodzin.

W razie zauważenia oznak rabunku nie prowadzić leczenia. W okresach występowania wysokich temperatur zewnętrznych płytki umieszczać w ulu wcześniej rano lub przed zachodem słońca, co umożliwi stopniowe uwalnianie substancji czynnych i ograniczy niepokojenie pszczoł.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Z uwagi na możliwość wystąpienia zapalenia skóry, ewentualnie podrażnienia skóry lub oczu związanego z obecnością tymolu, należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas posługiwania się produktem stosować rękawice ochronne. Po zakończeniu podawania, należy umyć ręce oraz sprzęt mający kontakt z produktem wodą z mydłem. W razie kontaktu ze skórą, umyć zanieczyszczone miejsca wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami przemyć dokładnie dużą ilością bieżącej wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Unikać wdychania oparów leku. Nie jeść i nie palić podczas stosowania leku.

Ciąża, laktacja: Nie dotyczy.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nie stosować podczas używania innych leków przeciwko warrozie.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Przedawkowanie spowodowane umieszczeniem w ulu większej liczby płytek może wywołać zaniepokojenie pszczoł, zwiększyć ich stres i zmienić ich zachowanie; pszczoły mogą wychodzić poza ul i tam pozostawać.

Główne niezgodności farmaceutyczne:

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia beużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwól one na lepszą ochronę środowiska. Api Life Var nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

Dostępne opakowania

Worek wielowarstwowy zawierający 2 płytki o wymiarach 7,5 x 5,0 x 0,5 cm i wadze 11 g.

Pozwolenie: 1489/04.

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Chemicals LAIF S.P.A., Via Roma 69, 36020 Castegnero (VI), Włochy.



ZWALCZANIE WARROZY

Apistrip

amitraz 500 mg/pasek

KONTROLA WARROZY

u pszczoł wywołanej przez *Varroa destructor*


WSKAZANIA LECZNICZE

Zwalczanie warrozy pszczoł wywołanej przez *Varroa destructor*.

1 pasek (10 g) zawiera:

Substancja czynna:

✦ **Amitraz 500 mg**



Kiedy stosować?

późne lato
- jesień

Leczenie zaleca się stosować
po ostatnim miodobraniu

Jak stosować?

2 paski / ul

Paski pozostawić w ulu na 8-10 tygodni,
a następnie je usunąć.

Apistrip – paski zawierające amitraz 500 mg

✦ prostokątne paski o gładkich powierzchniach,
barwy białej, z wyciętym otworem na jednym końcu

✦ większy wymiar paska 4,5 cm x 20 cm

✦ paski zawierają parafinę, która wpływa
na elastyczność i „wypacanie się” amitrazu
na powierzchni paska



Paski do zawieszania w ulu dla pszczoł miodnych

Zawartość substancji czynnej i innych substancji

1 pasek (10 g) zawiera:

Substancja czynna: Amitraz 500 mg.

Paski o gładkich powierzchniach, prostokątne, barwy białej, jednorodne, z wyciętym otworem na jednym końcu.

Wskazania lecznicze

Zwalczanie warrozy pszczoł wywołanej przez *Varroa destructor*.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach znanej oporności na amitraz.

Działania niepożądane

Przebiegowa zmiana zachowania (np. ucieczka, zachowania agresywne) może być obserwowana podczas umieszczania po raz pierwszy pasków w ulu. Uważa się, że jest to zachowanie obronne, a nie reakcja niepożądana produktu.


O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulocie (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <https://www.urpl.gov.pl> (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania

Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w ilości 2 paski/1ul, co odpowiada 1 g amitrazu na 1 ul (1 rodzinę pszczoła).

Użyć dwóch pasków na 1 rodzinę pszczoła (rys. 1). Do zamocowania paska pomiędzy ramkami należy użyć patyczka (wykalczki) przeprowadzonego przez otwór w górnej części paska (rys.2).

Każdy z pasków należy włożyć pomiędzy ramki znajdujące się w części gniazdowej ula, opierając patyczek na górnych częściach ramek (rys. 3). Należy zachować minimalną odległość dwóch ramek pomiędzy paskami. Paski należy umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczoł w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do obu ich stron.



Paski pozostawić w ulu na okres 8 tygodni, a następnie je usunąć. W przypadku obecności czerwii, paski należy pozostawić na 10 tygodni i usunąć je po zakończeniu leczenia.

Zalecenia dla prawidłowego podania

W trakcie leczenia, okresowo kontrolować stan pasków i miejsce ich zawieszania. W przypadku gdy paski są pokryte propolisem lub woskiem, należy delikatnie je oczyścić za pomocą dłuta pasiecznego. Następnie paski należy umieścić w ulu ponownie oraz, w razie potrzeby, zmienić ich miejsce zawieszania zgodnie z powyższymi instrukcjami stosowania (w przypadku zmian dotyczących powierzchni czerwii). Leczenie zaleca się stosować po ostatnim miodobraniu (późne lato/jesień). W celu ustalenia najlepszego czasu leczenia zaleca się kontrolowanie poziomu zakażenia pasożytami. Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie. Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek. Nie należy przecinać pasków. Nie należy ponownie używać tych samych pasków.

Okres karencji

Miód: zero dni. Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego. Przynajmniej raz na trzy lata plastry z części gniazdowej powinny być zastępowane ramkami ze świeżą węzą.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed światłem. Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt: Bezpieczeństwo i skuteczność produktu badano jedynie w rodzinach osadzonych w ulach jednokorpusowych, w związku z czym nie zaleca się stosowania w ulach wielokorpusowych. **Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:** Nie należy przekraczać lub zmniejszać zalecanej dawki i zalecanego czasu stosowania. Usunąć paski po zakończeniu leczenia. Niewłaściwe stosowanie produktu może skutkować zwiększonym ryzykiem rozwoju oporności i powodować zmniejszenie skuteczności leczenia. Skuteczność terapii powinna być monitorowana w trakcie leczenia oraz w późniejszym okresie. W przypadku podejrzenia oporności na amitraz, możliwość zastosowania produktu powinna być poparta wynikami testów wrażliwości. **Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:** Osoby o znanej nadwrażliwości na amitraz powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Produkt zawiera amitraz, który może prowadzić do wystąpienia neurologicznych objawów niepożądanych u ludzi. Amitraz jest inhibitorem monoaminooksydazy, dlatego osoby przyjmujące inhibitory monoaminooksydazy, leczone się z powodu nadciśnienia lub cukrzycy powinny zachować szczególną ostrożność. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. Amitraz może powodować wystąpienie reakcji uczuleniowych na skórze (reakcje alergiczne, zwłaszcza wysypki skórne). Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu, natychmiast przepłukać dużą ilością wody. Podczas pracy z produktem należy używać osobistego sprzętu ochronnego, nieprzepuszczalnych rękawic i zwykłej odzieży ochronnej stosowanej w pszczelarstwie. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać ulotkę dołączoną do opakowania. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu. Dzieci powinny przebywać w bezpiecznej odległości podczas stosowania produktu. Umyć ręce po zastosowaniu produktu. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Toksyczność amitrazu zwiększa się w obecności soli miedzi, a skuteczność terapeutyczna zmniejsza się w obecności butoksydu piperonylowego. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych substancji z amitrazem. Amitraz może zwiększać toksyczność innych akarycydów. Nie stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwarozowymi. Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): Produkt stosowano w pięciokrotnej dawce przewyższającej zalecaną dawkę przez 6 tygodni w skupionych rojach w bardzo gorące dni. Nie zaobserwowano żadnych objawów. Przy 1,5-krotnej dawce przewyższającej zalecaną dawkę stosowaną przez 10 tygodni nie zaobserwowano żadnych widocznych objawów niepożądanych u pszczoł.

Główne niezgodności farmaceutyczne: Nieznane.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów, jeśli ma to zastosowanie

Odpady należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Amitraz nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

Wydawany z przepisu lekarza – Rp. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Pozwolenie: 3091/21

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym:

Biowet Puławy Sp. z o.o.,
ul. H. Arcluca 2, Polska,
24-100 Puławy, tel. +48 81 886 33 53
e-mail: sekretariat@biowet.pl



ZWALCZANIE WARROZY

Apiwarol®

amitraz 12,5 mg/tabletkę



Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się poprzez odymianie Apiwarolem:

- * **wiosną** dwukrotnie i
- * **jesienią** dwu- lub trzykrotnie w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwiu.



Tabletkę w specjalnie wygiętym podajniku z drutu należy zapalić, a powstały ewentualnie płomień zdmuchnąć.

Tłącą się tabletkę wprowadzić przez wylot do ula, umieszczając ją na dennicy pod ramkami. Stosowanie tabletek Apiwarol w ulach styropianowych wymaga wcześniejszego włożenia na dno ula niepalnych wkładek, w przeciwnym razie tłąca tabletką będzie uszkadzać dennicę.(1)

ZWALCZANIE WARROZY

Tabletki fumigacyjne do diagnozowania i zwalczania warrozy pszczoł

Amitraz 12,5 mg/tabletkę

Tabletka Apiwarol zawiera jedną dawkę leczniczą amitrazu, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej.



Zamknąć wylot na okres 20 minut. Następnie wylot otworzyć i sprawdzić czy tabletką uległa spaleni. **Jeżeli tabletką nie spaliła się, zabieg należy powtórzyć.** W ulach z elementami wykonanymi ze styropianu, spalanie tabletek można wykonywać na pasku metalowej siatki.



Tłącą się tabletkę położyć na wąskim (3-4 cm) pasku gęstej, metalowej siatki. Pasek metalowej siatki wraz z tłącą się tabletką wprowadzić do ula, umieszczając go na dennicy pod ramkami.



1 tabletką/jednorazowe odymienie rodziny pszczelej

Apiwarol

Tabletki fumigacyjne do diagnozowania i zwalczania warrozy pszczoł.

Zawartość substancji czynnej

Amitraz 12,5 mg/tabletkę.

Wskazania lecznicze

Diagnozowanie i zwalczanie warrozy pszczoł wywoływanej przez *Varroa destructor*.

Przeciwwskazania

Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego. Nie odymiać pszczoł przy temperaturze niższej niż +10°C. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania

Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczoł. Tabletkę ująć w szczypce i zapalić, powstały ewentualnie płomień zdmuchnąć. Tłącą się tabletkę położyć na wąskim (3-4 cm) pasku gęstej siatki metalowej, lub specjalnie wygiętym podajniku z drutu, co ułatwia dostęp powietrza do tabletki. Tłącą tabletkę wraz z siatką wprowadzić przez wylot do ula umieszczając ją na dennicy pod ramkami. Zamknąć wylot na okres 20 minut. Następnie wylot otworzyć i sprawdzić czy tabletka uległa spaleni. Jeśli tabletka nie spaliła się zabieg należy powtórzyć. Przy diagnozowaniu warrozy należy postępować jak wyżej, umieszczając wcześniej na dnie ula arkusz papieru posmarowany tłuszczem roślinnym. Po upływie godziny od czasu odymiania należy wyjąć arkusz papieru i sprawdzić na nim obecność pasozyta.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Apiwarol działa wyłącznie na roztocza *Varroa destructor* znajdujące się na powłokach zewnętrznych pszczoł. Nie niszczy pasozyta i jego form rozwojowych znajdujących się na zasklepionym czerwiu. Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się przeprowadzając odymianie wiosną dwukrotnie i jesienią dwu- lub trzykrotnie w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwia. W sezonie pasiecznym walkę z pasozytem można prowadzić przez wycinanie zasklepionego czerwia trutowego. Odymianie wykonywać należy wieczorem po zakończonym locie pszczoł. Ze względu na możliwość przenikania amitrazy do miodu, jesienne leczenie należy przeprowadzić po usunięciu z ula zapasów miodu przeznaczonego do konsumpcji.

Okres karencji

Miód – 5 dni. Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

Działania niepożądane

Przy niewłaściwym sposobie stosowania produktu może wystąpić zamieranie czerwia. Odymianie może powodować wzmożoną ruchliwość pszczoł.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <http://www.urpl.gov.pl> (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w pojemniku szczelnie zamkniętym w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika – 24 dni.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Działanie amitrazy na organizm ludzki nie zostało dokładnie poznane. W celu uniknięcia wdychania dymu zabiegi należy wykonywać w masce ochronnej. W razie zaobserwowania po kontakcie z lekiem niepokojących objawów, takich jak wymioty, zaburzenia rytmu serca czy zaburzenia ze strony układu nerwowego, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników Apiwarolu powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie wykonywania zabiegu. Po zabiegu umyć ręce. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Nieznane.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Podanie (spalenie w ulu) większej liczby tabletek niż zalecana może spowodować nadmierne pobudzenie pszczoł.

Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania nieużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Amitraz jest toksyczny dla ryb, należy zwrócić uwagę, aby produkt nie dostał się do zbiorników wodnych.

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia beużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwólą one na lepszą ochronę środowiska.

Wielkość opakowania

Pojemnik z LDPE z wieczkiem, zawierający 25 tabletek, pakowany pojedynczo w pudełko tekturowe.

Okres ważności 1 rok.

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Pozwolenie nr 740/99.



ZWALCZANIE WARROZY

Biowar®

amitraz 500 mg/pasek

ZWALCZANIE

WARROZY

Paski do zawieszania w ulu
dla pszczoły miodnej

Amitraz 500 mg/pasek



Biowar przeznaczony jest do zawieszania w ulu w dawce:

2 paski/1 rodzinę pszczelą

- * **wiosna** - leczenie prowadzić przed pierwszym pożytkiem towarowym
- * **jesień** - leczenie prowadzić po ostatnim miodobraniu.

Paski Biowar umieścić w uliczkach o najbardziej intensywnym ruchu pszczoł. Poprzez wprowadzenia patyczka w specjalnie przygotowany otwór w każdym pasku, możemy w łatwy sposób umieścić go w uliczce międzyramkowej. Uliczki przed włożeniem pasków należy poszerzyć tak, aby pszczoły miały swobodny dostęp do obydwu stron paska.

W ulach, w których stosuje się beleczyki odstępnikowe, można to uzyskać poprzez zastosowanie w jednej uliczce międzyramkowej dwóch beleczyk odstępnikowych.

W ulach wysokich np. warszawski - paski należy zawiesić niżej, tak aby znalazły się w miejscu największej ruchliwości pszczoł. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak, **aby znajdowały się one w miejscu największego gromadzenia się pszczoł. Nie zawieszać pasków w zbyt wąskich uliczkach lub na skraju gniazda, gdyż są one niezbyt licznie obsiedlane przez pszczoły.**(2)



Paski pozostawić w ulu na okres 8 tygodni, następnie je usunąć.

Zaleca się jednoczesne prowadzenie leczenia we wszystkich ulach danej pasieki.



Biowar

Paski do zawieszania w ulu dla pszczoły miodnej

Zawartość substancji czynnej i innych substancji

1 pasek zawiera:

Substancja czynna:

Amitraz 500 mg

Wskazania lecznicze

Zwalczanie warrozy pszczół.

Przeciwwskazania

Brak

Działania niepożądane

Nieznanie.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <https://www.urpl.gov.pl> (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych)

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania

Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce: 2 paski/1 ul.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół.

Paski zawiesić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron, co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu między ramkami.

Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni. Pasków nie należy używać ponownie.

Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie.

Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym.

Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek.

Okres karencji

Miód – zero dni.

Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedowidcznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Leczyć wszystkie rodziny w pasiece jednocześnie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Manipulację z paskami wykonywać w rękawicach ochronnych.

Podczas aplikacji nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.

Podczas stosowania nie dopuszczać do kontaktu ze skórą i oczami.

Po wykonaniu zabiegu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.

Nie dopuszczać do kontaktu produktu z żywnością.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Toksyczność amitrazu wzrasta w obecności soli miedzi, a skuteczność spada w obecności butylofenku piperonylu. Należy unikać stosowania tych substancji jednocześnie z amitrazem.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Podczas stosowania dawek 5-krotnie wyższych od zalecanych przez 6 tygodni nie zaobserwowano wystąpienia objawów niepożądanych.

Niezgodności farmaceutyczne:

Nieznanie

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Amitraz jest toksyczny dla ryb, należy zwrócić uwagę, aby produkt nie dostał się do zbiorników ani cieków wodnych.

Okres ważności

Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży – 18 m-cy.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Pudełko tekturowe zawierające 10 pasków zamkniętych w saszetce PET/Aluminium/PE.

Inne informacje

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Wyłącznie dla zwierząt

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii

Pozwolenie: 2085/11



MONITOROWANIE OSYPU WARROZY

STOSOWANIE WKŁADEK

Badanie naturalnego osypu *Varroa destructor* na przełomie lipca i sierpnia pozwala na dokonanie oceny zagrożenia rodzin pszczelich przez *Varroa destructor* i podjęcia decyzji o terminie zastosowania preparatów warroabójczych.



W ofercie:

Przyrząd do spalania
tabletek Apiwarolu



Wkładka do ula do monitorowania
osypu warrozy



Data opracowania: styczeń 2023 r.